

こだま Q&A



Q29

妊娠中に風疹患者と濃厚な接触がありました。こういう場合、どの検査をしたらいいですか。

A29

ペア血清で、「風疹ウイルス (HI 法)」および「風疹ウイルス IgM (EIA 法)」の測定をお勧めします。

1～2週間の間隔で2回測定します。

なお、「風疹ウイルス (ラテックス法)」でのペア血清による評価は避けてください。



ご依頼の際には、依頼書欄外項目に「風疹 (HI 法)」とご記入ください。

☞当検査センター『総合検査案内2012』61ページを参照

お問合せ：☎代表 0120-14-7191(フリーダイヤル) / 082-247-7191(ダイヤルイン)

きやうちボール

臨床検査センター経理課の新設に伴い、本年4月より勤務しております。

会員から信頼されるセンター事務の再構築を図りたいとの意向により、広島信用金庫から出向してまいりました。

前職では、営業店を初めとして総務、市場、事務、監査、秘書等幅広く経験させていただきましたが、医療関係はまったくの素人でのスタートとなります。センターの先輩をはじめ会員の皆様のご指導を賜りながら、まずは事務の堅確化から取り組みたいと考えておりますので、よろしく願いいたします。

矢野 太 (経理課課長)

広報委員

谷敷 圭美 / 釘宮 亘 / 熊川 良則 / 片山 智恵子 / 初岡 博 / 高磨 潤

