

## 総合報告書 内容変更 再度のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、総合報告書の検査基準範囲変更(インフォメーションNo. 2020-26)、  
および臨床判断値の掲載をいたしますのでご案内申し上げます。

### 記

#### ■実施日 令和2年6月1日(月) ご依頼分より

#### ■変更内容

##### ① 検査基準範囲の変更

\* 検査データ手帳、報告書貼付台紙をご利用の場合は、基準範囲が異なりますので、  
新しい手帳、台紙を注文頂きご利用ください。

##### ② 臨床判断値の掲載

項目名称	臨床判断値	ガイドライン	編集
尿酸	M: 3.6-7.0 (mg/dL) F: 2.3-7.0 (mg/dL)	高尿酸血症・痛風の治療 ガイドライン第2版 高尿酸血症の定義	日本痛風・核酸代謝学会
中性脂肪	30-149 (mg/dL)	動脈硬化性疾患予防 ガイドライン 2017年版 脂質異常症診断基準	動脈硬化学会
HDL-コレステロール	40 以上 (mg/dL)		
LDL-コレステロール	70-139 (mg/dL)		

\* 上記臨床判断値は、これまで当検査センターで基準範囲として採用していましたが、  
今後は、特定の病態について、その診断、予防や治療、予後について判断を  
行う基準としてご参照下さい。

※報告書見本については、裏面をご参照ください。

<総合報告書見本>

新

総合報告書				検査コード				検査科				検査者				患者コード					
受診番号 受診日 氏名				受診番号 受診日 氏名				受診番号 受診日 氏名				受診番号 受診日 氏名				受診番号 受診日 氏名					
検査項目	基準範囲	検査結果	単位	検査項目	基準範囲	検査結果	単位	検査項目	基準範囲	検査結果	単位	検査項目	基準範囲	検査結果	単位	検査項目	基準範囲	検査結果	単位		
総蛋白	6.0~8.1 g/dL		(S)	白血球数	3.5~8.0 10 <sup>3</sup> /μL		(P)	TSH	0.50~5.00 μIU/mL		(S)	Free T <sub>4</sub>	230~430 pg/mL		(S)	Free T <sub>3</sub>	200~170 ng/dL		(S)		
アルブミン	4.1~5.1 g/dL		(S)	赤血球数	4.5~5.5 10 <sup>6</sup> /μL		(P)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	TW6濃3倍代	2.0 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A/G 比	1.32~2.23		(S)	ヘマトクリット	35.0~45.0 %		(P)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	抗T <sub>g</sub> Ab	28 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
遊離チロキシン	0.4~1.5 ng/dL		(S)	血小版数	150~340 10 <sup>3</sup> /μL		(P)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
遊離トリロキシン	0~0.3 ng/dL		(S)	M C V	83.0~98.2 fL		(P)	NT-proBNP	125 pg/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
AST(GOT)	13~30 U/L		(S)	M C H	27.5~33.2 pg		(P)	BNP	16.4 pg/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
ALT(GPT)	7~15 U/L		(S)	M C H C	31.7~35.3 g/dL		(P)	CEA	5.0 ng/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
LD(LDH)	124~222 U/L		(S)	中性球	40.0~71.0 %		(P)	AFF値	10.0 ng/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A L P	100~322 U/L		(S)	好酸球	0.0~1.0 %		(P)	PIVKA-II	40 ng/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
γ-GTP	7~15 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)	CA19-9	37.0 U/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
L A P	30~80 U/L		(S)	リンパ球	26.0~46.0 %		(P)	CA15-3	31.3 pg/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
AST(GOT)	13~30 U/L		(S)	単球	3.0~8.0 %		(P)	PSA総値	4.00 ng/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
ALT(GPT)	7~15 U/L		(S)	血小板	130~400 10 <sup>3</sup> /μL		(P)	MMP-3	113.0 ng/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
LD(LDH)	124~222 U/L		(S)	白血球	4,000~10,000 /mm <sup>3</sup>		(P)	フェリチン	7.40 ng/mL		(S)	抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A L P	100~322 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
γ-GTP	7~15 U/L		(S)	好酸球	0.0~1.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
L A P	30~80 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
AST(GOT)	13~30 U/L		(S)	リンパ球	26.0~46.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
ALT(GPT)	7~15 U/L		(S)	単球	3.0~8.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
LD(LDH)	124~222 U/L		(S)	血小板	130~400 10 <sup>3</sup> /μL		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A L P	100~322 U/L		(S)	白血球	4,000~10,000 /mm <sup>3</sup>		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
γ-GTP	7~15 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
L A P	30~80 U/L		(S)	好酸球	0.0~1.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
AST(GOT)	13~30 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
ALT(GPT)	7~15 U/L		(S)	リンパ球	26.0~46.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
LD(LDH)	124~222 U/L		(S)	単球	3.0~8.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A L P	100~322 U/L		(S)	血小板	130~400 10 <sup>3</sup> /μL		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
γ-GTP	7~15 U/L		(S)	白血球	4,000~10,000 /mm <sup>3</sup>		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
L A P	30~80 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
AST(GOT)	13~30 U/L		(S)	好酸球	0.0~1.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
ALT(GPT)	7~15 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
LD(LDH)	124~222 U/L		(S)	リンパ球	26.0~46.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A L P	100~322 U/L		(S)	単球	3.0~8.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
γ-GTP	7~15 U/L		(S)	血小板	130~400 10 <sup>3</sup> /μL		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
L A P	30~80 U/L		(S)	白血球	4,000~10,000 /mm <sup>3</sup>		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
AST(GOT)	13~30 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
ALT(GPT)	7~15 U/L		(S)	好酸球	0.0~1.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
LD(LDH)	124~222 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A L P	100~322 U/L		(S)	リンパ球	26.0~46.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
γ-GTP	7~15 U/L		(S)	単球	3.0~8.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
L A P	30~80 U/L		(S)	血小板	130~400 10 <sup>3</sup> /μL		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
AST(GOT)	13~30 U/L		(S)	白血球	4,000~10,000 /mm <sup>3</sup>		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
ALT(GPT)	7~15 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
LD(LDH)	124~222 U/L		(S)	好酸球	0.0~1.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A L P	100~322 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
γ-GTP	7~15 U/L		(S)	リンパ球	26.0~46.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
L A P	30~80 U/L		(S)	単球	3.0~8.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
AST(GOT)	13~30 U/L		(S)	血小板	130~400 10 <sup>3</sup> /μL		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
ALT(GPT)	7~15 U/L		(S)	白血球	4,000~10,000 /mm <sup>3</sup>		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
LD(LDH)	124~222 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A L P	100~322 U/L		(S)	好酸球	0.0~1.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
γ-GTP	7~15 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
L A P	30~80 U/L		(S)	リンパ球	26.0~46.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
AST(GOT)	13~30 U/L		(S)	単球	3.0~8.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
ALT(GPT)	7~15 U/L		(S)	血小板	130~400 10 <sup>3</sup> /μL		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
LD(LDH)	124~222 U/L		(S)	白血球	4,000~10,000 /mm <sup>3</sup>		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
A L P	100~322 U/L		(S)	好中球	40.0~71.0 %		(P)					抗TPO Ab	16 検出		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL		(S)	Free T <sub>3</sub>	600~170 ng/dL
γ-GTP	7~15 U/L																				