

# コールセンター Q&A

## Q124

医療従事者です。麻疹 EIA (IgG) 6.0 と結果が返ってきました。  
ワクチン接種が必要でしょうか？

## A124

麻疹 EIA (IgG) 6.0 は、抗体はあるが、感染予防における抗体価の『基準を満たさない陽性』に該当します。接種不相当者(\*)に該当していなければ、あと1回予防接種が必要となります。なお、抗体価陰性者や基準を満たさない陽性者が予防接種後、『基準を満たす陽性』になるまで追加接種する必要はありません。接種後の抗体価測定も必須ではないとされています。

(\*)明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者、妊娠していることが明らかな者、発熱、重篤な急性疾患にかかっている者、本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者には接種してはならない。

<医療関係者における予防接種目安（予防接種の記録がない場合）>

疾患名	検査方法	抗体価陰性 あと2回の予防接種が必要	基準を満たさない陽性 あと1回の予防接種が必要	基準を満たす陽性 今すぐの予防接種は不要
麻疹	EIA (IgG)	2.0未満	2.0以上16.0未満	16.0以上
	PA	16倍未満	16倍以上128倍以下	256倍以上
風疹	EIA (IgG)	2.0未満	2.0以上8.0未満	8.0以上
	HI	8倍未満	8倍、16倍	32倍以上
水痘	EIA (IgG)	2.0未満	2.0以上4.0未満	4.0以上
流行性耳下腺炎	EIA (IgG)	2.0未満	2.0以上4.0未満	4.0以上

参考資料：医療関係者のためのワクチンガイドライン 第3版（一般社団法人 日本環境感染学会）

担当 生化・免疫係

<広報委員> 石田 啓 / 石田 有里 / 新見 唯可

\*ウェブサイトでもご覧いただけます。 <http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp/>