■主なクラミジア・トラコマティス（以下、C.トラコマティス）感染症の診断法とご依頼方法 （平成23年10月現在）

（1）C.トラコマティス DNA（PCR法）＜外注検査＞

基準値	陰性	所要日数	3～5日	容器	
検査材料・検体量				男性	女性
男性	初尿5ml			㉑（滅菌試験管）	F1（女性用）
女性	子宮頸管分泌物				
その他	咽頭ぬぐい液（男、女）				
判断料	150点（微生物学的検査判断料）				
実施料	210点				
掲載依頼書	依頼書　Ⅱ				
レセプト名	C.トラコマチス核酸同定検査				
採取法の詳細	『総合検査案内'10』の72～73ページをご参照ください。				

（2）淋菌及びC.トラコマティス r-RNA同時同定（TMA法）＜外注検査＞

基準値	陰性	所要日数	3～5日	容器	
検査材料・検体量				男性	女性
男性	初尿5ml　または　尿道分泌物			F2（尿用）	F2（分泌物用）
女性	子宮頸管分泌物				
その他	咽頭ぬぐい液（男、女）			F2（分泌物用）	
判断料	150点（微生物学的検査判断料）				
実施料	300点				
掲載依頼書	依頼書Ⅱ				
レセプト名	淋菌及びC.トラコマチス同時核酸増幅同定検査				
採取法の詳細	『総合検査案内'10』の72～73ページをご参照ください。				

（3）C.トラコマティス抗原（EIA法）＜所内検査＞

基準値	陰性	所要日数	1日	容器	
検査材料・検体量				男性	女性
男性	初尿10ml　または　尿道分泌物			W2（男性用）	W2（女性用）
女性	子宮頸管分泌物				
その他	咽頭ぬぐい液（男、女）　※参考値				
判断料	144点（免疫学的検査判断料）				
実施料	170点			㉑（滅菌試験管）	
掲載依頼書	依頼書Ⅰ				
レセプト名	C.トラコマチス抗原				
採取法の詳細	『総合検査案内'10』の72～73ページをご参照ください。				

（4）C.トラコマテイス抗体 IgA/IgG（ELISA法）＜所内検査＞

基準値	0.9未満　陰性	所要日数	2～3日	容器
検査材料・検体量				X（生化学採血管）
血液3.0ml				
判断料	144点（免疫学的検査判断料）			
実施料	220点			
掲載依頼書	依頼書Ⅰ			
レセプト名	グロブリンクラス別C.トラコマチス抗体価			
結果解釈等	『総合検査案内'10』の72～73ページをご参照ください。			

◆レセプト請求上の留意点◆　（平成23年10月現在）

抗原系検査（1）（2）（3）に関して
　＊（1）（2）（3）を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

抗原系検査（3）に関して
　＊結膜、鼻腔検体を用いた検査は封入体結膜炎もしくはトラコーマまたは乳児クラミジアトラコマチス肺炎の診断のために実施した場合のみ算定できる。

抗体系検査（4）に関して
　＊C.トラコマチス抗原検出の時期を逸した疾患や、検体採取困難な疾患（骨盤内感染症（PID）等）の診断に際し測定した場合に算定する。
　＊（4）の抗体価検査は他にIgMもあるが、IgMは新生児、乳幼児肺炎の診断に際し測定した場合に算定する。
　　IgA、IgG、IgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は主たるもののみ算定する。

『医科診療報酬点数表　平成22年4月版　（社会保険研究所発行）』より

故国松 広島市医師会 臨床検査センター
〒730-8611 広島市中区千田町三丁目8番6号
TEL：(082) 247-7191 / FAX：(082) 244-0403
フリーダイヤル：0120-14-7191